

Pioglitazone 病人用藥須知

服用pioglitazone前，請先仔細閱讀此用藥指南。本資訊無法取代醫師，無法針對您的疾病或治療提供解答。若對pioglitazone有任何疑問，請詢問醫師或藥師。

Pioglitazone 是什麼？

pioglitazone是一種處方藥物，適合搭配飲食與運動，以改善第二型糖尿病成人患者的血糖控制。Pioglitazone是一種糖尿病藥物，可作為單一藥物使用，或與其他糖尿病藥物併用。

目前並不清楚pioglitazone用於兒童的安全性和有效性。

如果您有下列狀況，請勿服用pioglitazone：

1. 重度心臟衰竭
2. 對pioglitazone 的任一成分過敏。pioglitazone的完整成分列表，請參見本用藥須知的結尾
3. 膀胱癌

如果您有上述病症，服用pioglitazone前請與您的醫師討論。

服用pioglitazone錠之前，我應該讓醫師知道哪些事？

服用pioglitazone之前，若有下列情況，請告訴醫師：

1. 心臟衰竭
2. 第一型（幼年型）糖尿病，或糖尿病酮酸中毒
3. 患有一種會使眼睛後方腫脹的糖尿病眼疾（黃斑水腫）
4. 肝功能問題
5. 已懷孕或計劃懷孕。目前並不清楚pioglitazone是否會傷害胎兒。如果您已懷孕或計劃懷孕，請與您的醫師討論懷孕期間控制血糖的最佳方式
6. 尚未進入更年期，卻已停經或經期不規律的女性，pioglitazone可能會增加懷孕的機會。服用pioglitazone前，請與醫師討論適當的避孕措施。若在服用pioglitazone期間懷孕，請立即告訴醫師。
7. 正在餵哺母乳，或計畫餵哺母乳。目前並不清楚pioglitazone是否會進入乳汁或傷害嬰兒。如果您餵哺母乳，請勿服用pioglitazone。請和醫師討論餵母乳期間最佳的控制血糖方式。
8. 請告訴醫師您服用的所有藥物，包括處方藥、非處方藥、維他命和草藥補充劑。
9. Pioglitazone和您服用的某些藥物可能產生交互作用。您或許必須調整

pioglitazone或其他藥物的劑量。

10. 請了解您服用的藥物。服用新的藥物之前，請列出您正在服用的藥物，供您的醫師和藥師參考，他們會告訴您，pioglitazone與這些藥物併用是否安全。

我該如何服用 pioglitazone ？

1. 完全依照醫師指示服用
2. 醫師可能會調整您的pioglitazone劑量，除非醫師要求，否則請勿自行調整pioglitazone劑量。
3. Pioglitazone可以單獨使用，或與其他糖尿病藥物併用，單用或併用，取決於您的血糖控制。
4. 每天服用一次pioglitazone，飯前飯後均可。
5. 如果您某日漏服一劑，請依處方繼續服用第二劑，醫師另有指示者除外。請勿在第二天一次服用兩劑。
6. 如果不慎服用過多pioglitazone，請立即致電醫師或藥師，或到醫院掛急診
7. 如果您的身體狀況不佳，例如發燒、感染、意外或手術，可能需要調整糖尿病藥物的劑量，請立即致電醫師或回診。
8. 開始服用pioglitazone後，應遵守飲食和運動計畫，定期測試血糖。
9. 醫師必須在您用藥之前為您驗血，用藥期間亦然。
10. 醫師也必須為您檢驗 HbA1C，以監測pioglitazone能否控制您的血糖。
11. 在您服用pioglitazone期間，醫師應定期為您檢查眼睛。
12. Pioglitazone可能需要 2~3 個月才能完全發揮血糖控制的效果。

Pioglitazone可能有什麼副作用？

Pioglitazone可能會導致嚴重的副作用，包括：

1. Pioglitazone可能會使人體留住多餘的液體，導致水腫和體重增加。多餘的體液會導致某些心臟問題惡化，甚至導致心臟衰竭。患有心臟衰竭時，心臟無法正常輸送血液。
 - 如果您有重度心臟衰竭，請勿服用pioglitazone
 - 如果您有心臟衰竭症狀（如呼吸急促或水腫），即使這些症狀並不嚴重，可能也不適合使用pioglitazone

如果您下列任一症狀，請立即致電醫師或回診：

- 水腫或體液滯留，尤其是腳踝或腿部

- 喘不過氣或呼吸困難，尤其在躺下時
- 體重異常劇增
- 不尋常的疲倦

2. 肝功能問題。

若有下列症狀，請立即致電醫師或回診：

- 噁心或嘔吐
- 胃痛
- 不尋常或不明原因的疲勞
- 食慾不振
- 尿色深
- 皮膚或眼白泛黃

3. 骨折。

通常發生在女性的小腿、腳和遠端較低位置的手臂、手腕。請和醫師討論，如何保持骨骼健康。

4. 膀胱癌。

服用pioglitazone可能增加膀胱癌的風險。若您正在接受膀胱癌之治療，請勿服用pioglitazone。若您出現下列的疑似膀胱癌症狀，請立即告訴醫師：

- 尿液中有血，或帶紅色
- 需要排尿的頻率增加
- 小便疼痛

5. 低血糖。如果三餐的用餐時間不正常，或者同時使用其他降血糖藥，或有其他健康問題，都可能會有低血糖症狀。血糖過低時，您可能覺得胸悶、頭暈、顫抖、飢餓。如果您有低血糖的問題，請致電醫師或回診。

6. 一種會使眼睛後方腫脹的糖尿病眼疾（黃斑水腫）。如果您的視覺發生變化，請立即告訴醫師。您的醫師應定期為您檢查眼睛。

7. 排卵而導致懷孕。尚未進入更年期而經期混亂的婦女，服用pioglitazone後可能會發生排卵。這會增加您受孕的機會。

pioglitazone的最常見副作用包括：

- 類似感冒的症狀（呼吸道感染）
- 頭痛
- 鼻竇感染
- 肌肉疼痛
- 喉嚨痛

若有任何惱人或持續的副作用，請告訴您的醫師。以上並未包含 pioglitazone 的全部副作用，若要了解更多資訊，請詢問醫師或藥師。

如何存放pioglitazone錠？

1. pioglitazone應存放在攝氏25度（華氏77度）的室溫下，可允許短時間存放於攝氏15~30度環境中。以原本的容器存放pioglitazone，避光放置。
2. pioglitazone藥瓶應保持密閉，避免受潮（遠離濕氣）。
3. pioglitazone和所有藥品，應放在兒童無法取得之處。

安全並有效使用pioglitazone的一般訊息

處方箋有時會超出用藥指南所列示的用途，若為處方箋未記載的適應症，則請勿服用pioglitazone。不要將pioglitazone送給他人，即使症狀相同，誤用仍可能對他人造成傷害。

本用藥須知概述pioglitazone的最重要資訊，若想要更加了解相關資訊，請和醫師或藥師討論，可向醫師或藥師索取為醫護專業人員撰寫的pioglitazone資訊。

pioglitazone的成分為何？

活性成分：pioglitazone hydrochloride